



CATÀLEG DE
PLANTES AUTÒCTONES
del viver forestal de les Illes Balears



CEFOR MENUT

CENTRE FORESTAL DE LES ILLES BALEARS



CATÀLEG DE

PLANTES AUTÒCTONES

del viver forestal de les Illes Balears



Conselleria d'Agricultura,
Pesca i Medi Natural
Direcció General de Medi Natural
i Gestió Forestal



CEFORMENUT
CENTRE FORESTAL DE LES ILLES BALEARS



XARXA
FORESTAL

Aquest catàleg té com a objectiu facilitar a la ciutadania el coneixement de les espècies autòctones que es produeixen en el viver del Centre Forestal de les Illes Balears - Finca de Menut (CEFOR). Aquestes poden constituir una alternativa a les plantes al·lòctones (no pròpies d'un territori) que emprem en els nostres jardins, evitant així que moltes d'aquestes plantes al·lòctones es puguin convertir en invasores quan es naturalitzen i es dispersen pel nostre entorn natural.

A la finca de Menut es va ubicar el viver forestal promogut pel Districte Forestal, l'any 1933. En l'actualitat forma part del Centre Forestal de les Illes Balears (CEFOR). Des d'aleshores, el centre ha passat per diferents fases, més o menys actives, tot i que la prioritat sempre ha estat la producció de planta forestal autòctona de qualitat de les Illes Balears.

En els darrers anys s'han anat incorporant altres funcions, com a centre d'investigació i innovació forestal, de conservació dels recursos genètics forestals en el banc de llavors, de divulgació de la cultura forestal i de la prevenció d'incendis mitjançant la sensibilització forestal.

Tota la planta que s'hi produeix disposa de la seva traçabilitat, des de la recollida de la llavor fins com i quan



Viver Forestal de les Illes Balears (CEFOR-Menut)

s'ha produït, a més a més, disposa del seu Passaport Fitosanitari. La recollida de llavors o de propàguls es realitza arreu de totes les Illes per tal de preservar la diversitat genètica de les espècies.

Aquestes plantes produïdes en el CEFOR es destinen principalment a:

- » **Reforestacions i restauracions** d'hàbitats, i **plans de recuperació d'espècies vegetals** (en situació de perill d'extinció) que efectua la pròpia Conselleria o altres institucions.
- » **Jardineria mediterrània** de baix manteniment i amb un consum reduït d'aigua.



Viver Forestal de les Illes Balears (CEFOR-Menut)

Reforestacions i restauracions d'hàbitats

Una reforestació consisteix a plantar arbres en àrees que alguna vegada han estat cobertes de bosc, però que han estat degradades o desforestades a causa de l'activitat humana o a altres impactes com són els incendis forestals. Té com a objectiu restaurar els ecosistemes forestals i augmentar la cobertura de boscos per proporcionar una ampla gamma de beneficis, com per exemple la conservació de la biodiversitat, la protecció del sòl, la mitigació del canvi climàtic, la captura de carboni i la millora de la infiltració d'aigua als aquífers.

La idea d'una restauració d'hàbitats és la mateixa que en una reforestació, però en aquest cas canvia una mica l'objectiu, que no és només aconseguir una cobertura boscosa, sinó que pot ser aconseguir un hàbitat determinat, encara que aquest no disposi d'arbres. Els beneficis d'una restauració d'hàbitats degradats són els mateixos que els d'una reforestació.

Per tal de destriar les espècies i ajudar a aconseguir aquests objectius, al catàleg hi trobareu una petita descripció de cada un dels boscos presents a les Illes Balears, així com les plantes que es produïxen al viver i que poden ser utilitzades com a espècies clau per a la recuperació de cada tipus de bosc o hàbitat.

Jardineria mediterrània amb plantes autòctones

En els últims anys han aparegut diversos conceptes en el camp de la jardineria, com ara la jardineria sostenible, de baix manteniment, xerojardineria o mediterrània, però sovint aquests termes s'han buidat de significat.

A l'hora de dissenyar un jardí, és important tenir en compte la natura com a la nostra aliada i establir un equilibri entre el jardí i el seu entorn. Això implica observar la biodiversitat de la zona en què volem establir el jardí i plantar les espècies vegetals que mantinguin o fins i tot millorin la biodiversitat. A més, cal seleccionar espècies adaptades a l'entorn per evitar costos elevats de manteniment i tenir tolerància amb les espècies, tant vegetals com animals, que colonitzaran el nostre jardí. Malauradament, encara és comú pensar que tot allò que no estava previst a un jardí ha de ser erradicat, com són per exemple les mal anomenades “males herbes”.

És impossible esperar que un jardí estigui totalment separat de la natura que l'envolta. Les plantes no es mantenen estàtiques ni aïllades, sinó que interactuen amb altres plantes, animals i microorganismes del seu entorn. Les plantes del nostre jardí poden ser una zona de nidificació, un refugi o una font d'aliment per a la fauna local.





Les plantes atrauen o repel·leixen insectes i se poden comunicar entre si, intercanviant substàncies químiques. També col·laboren i competeixen pels recursos, es propaguen, retrocedeixen i reaccionen als canvis estacionals.

Quan creem un espai verd tenim control sobre on plantem, però tot el que passa a partir d'aquest moment al seu voltant és part d'un engranatge que no sempre és fàcil de predir. Aquesta imprevisibilitat i el canvi són motors de la biodiversitat, però també ho és el coneixement que anem adquirint. Crear i gestionar un jardí amb aquesta filosofia és un repte que implica aprendre a observar. Aquesta observació ens ajuda a connectar amb l'entorn natural i ens proporciona els coneixements necessaris per dirigir els jardins cap a l'equilibri adequat entre les persones i la natura.

Els sistemes insulars són fràgils i vulnerables a l'arribada de noves espècies (animals i vegetals) en un món globalitzat. La jardineria ornamental tradicional suposa una de les principals fonts d'introducció de plantes foranes (també coneudes com a exòtiques o al·lòctones) que han incrementat el perill d'invasions biològiques o l'arribada de noves malalties com és la *Xylella* o el cas de la introducció de la serp de ferradura.

A les Illes Balears s'han comptabilitzat al voltant de 600 espècies vegetals exòtiques de les quals 100 poden tenir potencial invasor del medi natural, 44 d'aquestes figuren en el «Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras» (Real Decreto 630/2013, de 2 d'agost). Moltes d'aquestes són plantes ornamentals amb un elevat potencial invasor, i al Decret **queda prohibida la seva possessió, el transport, el tràfic i el comerç d'exemplars vius o morts**. Hi trobem plantes que s'han utilitzat



tradicionalment en jardineria com són: *Agave americana*, *Ailanthus altissima*, *Araujia sericifera*, *Asparagus asparagooides*, *Carpobrotus spp.*, *Cortaderia spp.*, *Cylindropuntia spp.*, *Ipomoea indica*, *Opuntia sp. pl.*, *Pennisetum sp. pl.*, *Senecio inaequidens*, *Tradescantia fluminensis*, etc.

En un context de canvi climàtic com el que estem vivint i davant del perill de l'arribada de noves espècies més adaptades a les noves condicions, com són l'augment de la temperatura i la disminució de la pluviometria, caldrà



avaluar el risc d'invasió d'aquestes plantes, de les quals encara es desconeix el comportament.

La ciutadania i el sector de la jardineria en general tenen així la responsabilitat d'evitar la propagació al medi natural d'aquestes espècies potencialment invasores, que poden representar una amenaça. Aquest catàleg vol promoure uns coneixements per fer una gestió apropiada, per tal d'evitar plantar espècies foranes que poden colonitzar el medi natural, desplaçar la flora autòctona i canviar el paisatge. Per això, triar plantes autòctones de les Illes Balears i produïdes aquí, suposa apostar per cuidar el nostre paisatge, la nostra flora, la nostra fauna i fins i tot el nostre propi benestar.

Des del CEFOR s'ha elaborat aquest catàleg com una eina per donar a conèixer i oferir informació sobre les diferents espècies produïdes al viver. Cal dir que **no totes les espècies estan disponibles a totes les campanyes, i a vegades algunes espècies poden estar exhaurides**.

Prèvia sol·licitud administrativa, es pot donar planta de forma gratuïta amb finalitats didàctiques i de sensibilització forestal a centres educatius, aules de natura, tallers, fundacions i entitats sense ànim de lucre. I per últim s'entrega subjecta a preus públics, a empreses forestals i de jardineria i al públic en general.



Com utilitzar aquest catàleg

El catàleg s'articula com a llista d'espècies amb el nom científic, un nom popular, la distribució per illes, l'hàbitat forestal on poden viure, la mida mitjana que pot arribar a tenir cada espècie, l'època i color de la floració i de la fructificació. També altres aspectes com si disposen de fruits secs o carnosos, les necessitats hídriques, la insolació que necessiten, el seu port, si són resistentes a l'esprai marí o

a condicions salines, si atreuen papallones, l'interès apícola tant per pol·len com per nèctar, si atrauen ocells, si són resistentes als herbívors, si són plantes aromàtiques, si són adients per fer bardisses, si són plantes espinoses, si tenen parts comestibles o són tòxiques i per últim si es poden utilitzar per fer infusions o com a condiment. Aquí teniu la llegenda explicativa de cada concepte:

Llegenda

ENDEMISME: Si: No:

ILLES

Ma.: Mallorca | Me.: Menorca | Ei.: Eivissa
For.: Formentera | Ca.: Cabrera | Dra.: Dragonera

ÈPOCA FLORACIÓ / FRUCTIFICACIÓ:

Primavera Estiu Tardor Hivern

TIPUS FRUIT:

S: Sec C: Carnós

NECESSITATS HÍDRIQUES

💧 Baixes 💧 Mitjanes 💧💧 Elevades

INSOLACIÓ:

☀ Directe ☀ Ombra o semiombra

PORT:

♣ Arbre ♦ Arbust 🌳 Mata herbàcia o llenyosa

TOLERÀNCIA SALINITAT:

(res) Gens tolerant * Tolerant ** Molt tolerant

ATREUEN ABELLES I POL-LINITZADORS (NÈCTAR / POL·LEN):

❀ Baix interés
❀❀ Interés mitjà
❀❀❀ Interés elevat

7

ATREUEN:

🦋 Papallones | 🐦 Ocells

RESISTENT A HERBÍVORS: 🐐

PER BARDISSA: Si: No:

ESPINOSA: Si: No:

AROMÀTICA: Si: No:

PARTS COMESTIBLES:

stalk Tija | leaf Fulla | fruit Fruit | seed Llavor

💀 Tòxica

INFUSIÓ O CONDIMENT:

Índex

per nom científic | nom comú

<i>Acer granatense</i>	Rotaboc	35
<i>Achillea maritima</i>	Herba de Trucadors	27
<i>Ammophila arenaria</i>	Borró	27
<i>Ampelodesmos mauritanicus</i>	Càrritx	11
<i>Anagyris foetida</i>	Garrover del dimoni	19
<i>Anthemis maritima</i>	Bolig de mar	31
<i>Anthyllis cytisoides</i>	Albada	11
<i>Arbutus unedo</i>	Arboçera	15
<i>Artemisia caerulescens</i> subsp. <i>gallica</i>	Donzell marí	31
<i>Asparagus horridus</i>	Espereguera	19
<i>Astragalus balearicus</i>	Eixorba-rates negre	31
<i>Buxus balearica</i>	Boix	37
<i>Calystegia soldanella</i>	Campaneta de la mar	27
<i>Capparis spinosa</i>	Taparera	35
<i>Carlina corymbosa</i>	Card negre	19



<i>Celtis australis</i>	Lledoner	23
<i>Ceratonia siliqua</i>	Garrover	19
<i>Chamaerops humilis</i>	Garballó	19
<i>Cheirolophus intybaceus</i>	Bracera de roca	35
<i>Cistus albidus</i>	Estepa blanca	11
<i>Cistus clusii</i>	Romaní mascle	27
<i>Cistus creticus</i>	Estèpera blava	11
<i>Cistus monspeliensis</i>	Estepa llimonenca	19
<i>Cistus salviifolius</i>	Estepa negra	11
<i>Clematis flammula</i>	Vidriella	23
<i>Clinopodium rouyanum</i>		37
<i>Cneorum tricoccon</i>	Olivella	19
<i>Coronilla juncea</i>	Coroneta	11
<i>Coronilla valentina</i> subsp. <i>glaucua</i>	Carolina	19
<i>Crataegus monogyna</i>	Cirerer de pastor	23
<i>Crithmum maritimum</i>	Fonoll marí	31
<i>Dianthus rupicola</i> subsp. <i>bocchoriana</i>	Clavell de roca	35
<i>Digitalis minor</i>	Didalera	35
<i>Ephedra fragilis</i>	Trompera	19
<i>Erica arborea</i>	Bruc	15
<i>Erica multiflora</i>	Xiprell	11
<i>Eryngium maritimum</i>	Card marí	27
<i>Euphorbia characias</i>	Lletrera de visc	15
<i>Euphorbia dendroides</i>	Lletrerassa	20



<i>Euphorbia pithyusa</i>	Lletrera	20
<i>Ferula communis</i>	Canyaferla	20
<i>Fraxinus angustifolia</i>	Fleix	23
<i>Fumana laevis</i>		11
<i>Glaucium flavum</i>	Cascall marí	27
<i>Globularia alypum</i>	Cossiada	11
<i>Halimium halimifolium</i>	Estepa d'arenal	12
<i>Hedera helix</i>	Heura	15
<i>Helianthemum caput-felis</i>	Caps de moix	27
<i>Helichrysum italicum</i> subsp. <i>tyrrhenicum</i>	Sempreviva	31
<i>Helichrysum stoechas</i>	Flor de tot l'any	27
<i>Helleborus foetidus</i>	Palònica pudenta	15
<i>Hippocratea balearica</i>	Violeta de penyal	35
<i>Hypericum balearicum</i>	Estepa joana	37


<i>Hypericum perforatum</i>	Herba de Sant Joan	23
<i>Juncus acutus</i>	Jonc	31
<i>Juniperus oxycedrus</i>		
subsp. <i>macrocarpa</i>	Càdec	27
<i>Juniperus oxycedrus</i>		
subsp. <i>oxycedrus</i>	Ginebró	12
<i>Juniperus phoenicea</i>		
subsp. <i>turbinata</i>	Savina	28
<i>Launaea cervicornis</i>	Socarrell	31
<i>Laurus nobilis</i>	Lloret	23
<i>Lavandula dentata</i>	Gal·landa	12
<i>Lavandula stoechas</i>	Tomaní	12
<i>Limonium virgatum</i>	Saladina	31
<i>Lomelosia cretica</i>	Col de penya	35
<i>Lonicera implexa</i>	Garravera	20
<i>Lotus cytisoides</i>	Trèvol de platja	28
<i>Lotus dorycnium</i>	Botja	20



<i>Malva subovata</i>	Malva	32
<i>Medicago arborea</i>	Alfals arbori	20
<i>Medicago citrina</i>	Alfals arbori marí	20
<i>Myrtus communis</i>	Murtera	15
<i>Olea europaea</i>	Ullastre	20
<i>Ononis ramosissima</i>	Alorens	28
<i>Paeonia cambessedesii</i>	Peònia	15
<i>Pallenis maritima</i>	Botó de foc	32
<i>Pancratium maritimum</i>	Lliri de mar	28
<i>Phillyrea angustifolia</i>	Aladern de fulla estreta	12
<i>Phillyrea latifolia</i>	Aladern de fulla ampla	15
<i>Phillyrea media</i>	Aladern menorquí	20
<i>Phlomis italicica</i>	Estepa blanera	15
<i>Pinus halepensis</i>	Pi	12
<i>Pinus pinaster</i>	Pinastre	12
<i>Pinus pinea</i>	Pi ver	12
<i>Pistacia lentiscus</i>	Mata	21
<i>Populus alba</i>	Poll blanc	23
<i>Populus nigra</i>	Poll negre	23
<i>Prunus spinosa</i>	Aranyoner	23
<i>Quercus cerrioides</i>	Roure	24
<i>Quercus coccifera</i>	Coscoll	12
<i>Quercus ilex</i>	Alzina	16
<i>Rhamnus alaternus</i>	Llampúdol	21
<i>Rhamnus ludoviciana-salvatoris</i>	Llampúdol bord	16
<i>Rubus ulmifolius</i>	Abatzer	24
<i>Ruscus aculeatus</i>	Cirerer de betlem	16
<i>Ruta chalepensis</i>	Ruda	13



<i>Ruta montana</i>	Ruda de bosc	13
<i>Salvia rosmarinus</i>	Romaní	13
<i>Santolina magonica</i>	Camamil·la	32
<i>Tamarix canariensis</i>	Tamarell	32
<i>Tamarix gallica</i>	Tamarell	32
<i>Teucrium asiaticum</i>	Brutònica	37
<i>Teucrium balearicum</i>	Eixorba-rates blanc	37
<i>Teucrium capitatum</i>		
subsp. <i>majoricum</i>	Herba de Sant Ponç	13
<i>Teucrium dunense</i>	Herba de Sant Ponç de platja	28
<i>Thinopyrum junceum</i>	Fenàs de platja	28
<i>Thymbra capitata</i>	Frígola	13
<i>Thymelaea velutina</i>	Peu de milà	28
<i>Ulmus minor</i>	Om	24
<i>Viburnum tinus</i>	Marfull	16
<i>Vinca difformis</i>	Proenga	24
<i>Viola alba</i>	Viola	16
<i>Vitex agnus-castus</i>	Aloc	24



Els **PINARS** són la formació boscosa més extensa i rica en espècies vegetals de les Illes, amb una distribució que va des del nivell de la mar fins a més dels 500 metres d'altitud.

A causa de la seva condició de comunitat pionera i colonitzadora, és habitual que el pinar ocupa els conreus i les marjades abandonades. Juntament amb el savinar esdevé molt important en el litoral.

Pinar


Nom científic Nom comú	ILLES	ALÇADA	AMPLADA	MIDA ORIENTATIVA PLANTA ADULTA (m)		ÉPOCA FLORACIÓ		ÉPOCA FRUCTIFICACIÓ		TIPUS FRUIT (SEC/CARNOS)		NECESSITATS HÍDRIQUES		INSOLACIÓ		PORT		TOLERÀNCIA SALINITAT		ATREUEN ABELLES I POLLUNITZADORS		ATREUEN PAPALLONES		ATREUEN OCELLS		RESISTENT A HERBÍVORS		PER BARDISSA		ESPINOSA		AROMÀTICA		PARTS COMESTIBLES		INFUSIÓ O CONDIMENT	
				ENDÈMISME																																	
<i>Ampelodesmos mauritanicus</i> Càrritx	Ma. Me.	0,8-2	0,8-1							S																											
<i>Anthyllis cytisoides</i> Albada	Ma. El. For. Dra.	0,8-1,2	0,8-1,2							S																											
<i>Cistus albidus</i> Estepa blanca	Ma. Me. El. For. Ca.	0,6-1	0,6-1							S																											
<i>Cistus creticus</i> Estèpera blava	Me.	0,4-0,8	0,6-0,8							S																											
<i>Cistus salviifolius</i> Estepa negra	Ma. Me. El. For.	0,4-1	0,6-1							S																											
<i>Coronilla juncea</i> Coroneta	Ma. Me.	0,4-0,6	0,4-0,6							S																											
<i>Erica multiflora</i> Xiprell	Ma. Me. El. For. Ca.	0,5-1,5	0,5-1								S																										
<i>Fumana laevis</i>	Ma. Me. El. For.	0,1-0,3	0,2-0,3							S																											
<i>Globularia alypum</i> Cossiada	Ma. Me. El. Ca.	0,3-0,5	0,3-0,5							S																											

Pinar

Nom científic Nom comú	ENDEMISME ILLES	ALÇADA AMPLADA	MIDA ORIENTATIVA PLANTA ADULTA (m)	ÈPOCA FLORACIÓ		ÈPOCA FRUCTIFICACIÓ		TIPUS FRUIT (SEC/CARNOS) NECESSITATS HÍDRIQUES INSOLACIÓ	PORT	TOLERÀNCIA SALINITAT	ATREUEN ABELLES I POLLUNITZADORS		ATREUEN PAPALLONES		ATREUEN OCELLS RESISTENT A HERBÍVORS		PER BARDISSA		ESPINOSA		AROMÀTICA		PARTS COMESTIBLES		INFUSIÓ O CONDIMENT		
				ALÇADA	AMPLADA																						
<i>Halimium halimifolium</i> Estepa d'arenal	Ma.	1-1,5	1-1,5							S																	
<i>Juniperus oxycedrus</i> subsp. <i>oxycedrus</i> Ginebró	Ma. Me. El. For. Ca.	2-4	2-3							C																	
<i>Lavandula dentata</i> Gal-landa	Ma. El.	0,6-0,8	0,6-0,8							S																	
<i>Lavandula stoechas</i> Tomaní	Me.	0,2-0,4	0,2-0,4							S																	
<i>Phillyrea angustifolia</i> Aladern de fulla estreta	Ma. Me. El. For. Ca. Dra.	0,8-2	0,8-2							C																	
<i>Pinus halepensis</i> Pi	Ma. Me. El. For. Ca. Dra.	25	7-12							S																	
<i>Pinus pinaster</i> Pinastre	Me.	25	7-12							S																	
<i>Pinus pinea</i> Pi ver	Ma. El. For.	25	7-12							S																	
<i>Quercus coccifera</i> Coscoll	Ma. El.	2-4	2-5							S																	

Pinar

Nom científic Nom comú	ENDEMISME ILLES	MIDA ORIENTATIVA PLANTA ADULTA (m)	ÉPOCA FLORACIÓ		ÉPOCA FRUCTIFICACIÓ		TIPUS FRUIT (SEC/CARNOS) NECESSITATS HÍDRIQUES INSOLACIÓ	PORT	TOLERÀNCIA SALINITAT	ATREUEN ABELLES I POLLUNITZADORS		ATREUEN OCELLS I POL·LUNITZADORS		RESISTENT A HERBÍVORS PER BARDISSA		ESPINOSA AROMÀTICA		PARTS COMESTIBLES INFUSIÓ O CONDIMENT	
			ALÇADA	AMPLADA						NÉCTAR	POLLÈN								
<i>Ruta chalepensis</i> Ruda	Ma. Me. Ei. For. Ca. Dra.	0,3-0,5 0,3-0,4	0,3-0,4	0,3-0,4	✿				■	S	💧	☀️	⚡	✿	✿	✿	✿	✿	✿
<i>Ruta montana</i> Ruda de bosc	Ma.	0,1-0,5 0,2-0,4	0,1-0,5 0,2-0,4	0,1-0,5 0,2-0,4	✿				■	S	💧	☀️	⚡	✿	✿	✿	✿	✿	✿
<i>Salvia rosmarinus</i> (= <i>Rosmarinus officinalis</i>) Romaní	Ma. Me. Ei. For. Ca.	0,1-0,8 0,6-1,5	0,1-0,8 0,6-1,5	0,1-0,8 0,6-1,5	*	*	*		■	S	💧	☀️	⚡	✿	✿	✿	✿	✿	✿
<i>Teucrium capitatum</i> subsp. <i>majoricum</i> Herba de Sant Ponç	Ma. Me. Ei. For. Ca. Dra.	0,1-0,3 0,2-0,5	0,1-0,3 0,2-0,5	0,1-0,3 0,2-0,5	*				■	S	💧	☀️	⚡	✿	✿	✿	✿	✿	✿
<i>Thymbra capitata</i> Frígola	Ma. Ei. For.	0,2-0,5 0,3-0,7	0,2-0,5 0,3-0,7	0,2-0,5 0,3-0,7	*	*			■	S	💧	☀️	⚡	✿	✿	✿	✿	✿	✿



Els **ALZINARS** són ombrívols i humits, fet que condiciona la presència de poques espècies arbustives. Es distribueixen des del nivell de la mar fins als 900 metres d'altitud.

L'activitat humana tradicional de l'alzinar de les illes ha estat ben intensa durant segles.

La seva explotació pels carboners, llenyaters, calciners, pastors de porcs, etc. ha fet que a dia d'avui no trobem alzinars que no hagin estat modificats per l'activitat humana.


Alzinar

Nom científic Nom comú	ILLES	ENDÈMISME	MIDA ORIENTATIVA PLANTA ADULTA (m)	ÉPOCA FLORACIÓ		ÉPOCA FRUCTIFICACIÓ		TIPUS FRUIT (SEC/CARNOUS)		NECESSITATS HÍDRIQUES		INSOLACIÓ		PORT		TOLERÀNCIA SALINITAT		ATREUEN ABELLES I POL-LIMITZADORS		ATREUEN PAPALLONES		ATREUEN OCELLS		RESISTENT A HERBÍVORS		PER BARDISSA		ESPINOSA		AROMÀTICA		PARTS COMESTIBLES		INFUSIÓ O CONDIMENT	
				ALÇADA	AMPLADA																														
<i>Arbutus unedo</i> Arboçera		Ma. Me. El. Fo. Ca.	5-10 1,5-4													C																			
<i>Erica arborea</i> Bruc		Ma. Me. El. Ca.	2-5 2-3													S																			
<i>Euphorbia characias</i> Lletrera de visc		Ma. Me. Ca. Dra.	0,6-1 0,6-1													S																			
<i>Hedera helix</i> Heura		Ma. Me. El.	15-20 15-20													C																			
<i>Helleborus foetidus</i> Palònica pudenta		Ma.	0,3-0,6 0,3-0,6													S																			
<i>Myrtus communis</i> Murterà		Ma. Me. El.	0,8-4 1-3														C																		
<i>Paeonia cambessedesii</i> Peònia	✓	Ma. Me. Ca.	0,3-0,8 0,3-0,8														C																		
<i>Phillyrea latifolia</i> Aladern de fulla amplia		Ma. Me.	1-6 1-4														C																		
<i>Phlomis italicica</i> Estepa blanera	✓	Ma. Me.	0,7-1 1-1,5														S																		

Alzinar

Nom científic Nom comú	ENDÈMISME ILLES	MIDA ORIENTATIVA PLANTA ADULTA (m)	ÉPOCA FLORACIÓ		ÉPOCA FRUCTIFICACIÓ		TIPUS FRUIT (SEC/CARNOUS) NECESSITATS HÍDRIQUES	INSOLACIÓ	PORT	TOLERÀNCIA SALINITAT	ATREUEN ABELLES I POL-LINITZADORS	ATREUEN OCELLS	RESISTENT A HERBÍVORS	PER BARDISSA	ESPINOSA	AROMÀTICA	PARTS COMESTIBLES	INFUSIÓ O CONDIMENT
			ALÇADA	AMPLADA														
<i>Quercus ilex</i> Alzina	Ma. Me.	10-20	4-10	✿			S	💧	☀️	♣	✿✿ m	🐦	✓	🍏				
<i>Rhamnus ludovici-salvatoris</i> Llampúdol bord	✓ Ma. Me. Ca.	1-2	1-1,5	✿			C	💧	☀️	♣	✿✿ 🦋	🦋	✓					
<i>Ruscus aculeatus</i> Cirerer de betlem	Ma. Me. Ei. For. Ca.	0,4-1,2	0,4-1,5	✳		✳	C	💧	☀️	♣				✓				
<i>Viburnum tinus</i> Marfull	Ma. Me. Ei.	1,5-3,5	1,5-2	✳		✳	C	💧	☀️	♣	✳ ✖	🐦	✓					
<i>Viola alba</i> subsp. <i>dehnhartii</i> Viola	Ma.	0,1-0,2	0,1-0,4	✿		✿	S	💧	☀️	✿	✿	🦋						







Els **ULLASTRARS** són un dels exponents més representatius de la vegetació mediterrània pel seu caràcter càlid i sec, plenament adaptat a les dures condicions del clima.

Diversifiquen el paisatge insular i són font indispensable d'aliment i recursos per a la fauna.

Ullastrar

Nom científic Nom comú	ENDÈMISME ILLES	ALÇADA AMPLADA	MIDA ORIENTATIVA PLANTA ADULTA (m)	ÉPOCA FLORACIÓ		ÉPOCA FRUCTIFICACIÓ		TIPUS FRUIT (SEC/CARNOS) NECESSITATS HÍDRIQUES		INSOLACIÓ		PORT		TOLERÀNCIA SALINITAT		ATREUEN ABELLES NÉCTAR POL·LEN		ATREUEN OCELLS		RESISTENT A HERBÍVORS PER BARDISSA		ESPINOSA		AROMÀTICA		PARTS COMESTIBLES		INFUSIÓ O CONDIMENT	
				ALÇADA	AMPLADA																								
<i>Anagyris foetida</i> Garrover del dimoni	Ma. Me. Ei.	2-3	2-3					S																					
<i>Asparagus horridus</i> Espereguera	Ma. Me. Ei. For. Ca.	0,3-0,6	0,3-0,6					C				*	*																
<i>Carlina corymbosa</i> Card negre	Ma. Me. Ei. For. Ca.	0,2-0,4	0,3-0,5					S				*	*																
<i>Ceratonia siliqua</i> Garrover	Ma. Me. Ei. For. Ca.	10	3-8					C				m																	
<i>Chamaerops humilis</i> Garballó	Ma. Me. Ei.	1-6	1-3					C																					
<i>Cistus monspeliensis</i> Estepa llimonenca	Ma. Me. Ei. For. Ca. Dra.	0,5-1	0,5-1					S																					
<i>Cneorum tricoccon</i> Olivella	Ma. Me. Ei. For. Ca. Dra.	0,4-0,8	0,4-0,8					C																					
<i>Coronilla valentina</i> subsp. <i>glauca</i> Carolina	Ma. Me.	0,8-1,2	0,8-1,2					S																					
<i>Ephedra fragilis</i> Trompera	Ma. Me. Ei. For. Ca. Dra.	2-3	2-3					C				*																	

Ullastrar

Nom científic Nom comú	ENDÈMISME ILLES	MIDA ORIENTATIVA PLANTA ADULTA (m)		ÉPOCA FLORACIÓ		ÉPOCA FRUCTIFICACIÓ		TIPUS FRUIT (SEC/CARNOUS) NECESSITATS HÍDRIQUES		INSOLACIÓ		PORT		TOLERÀNCIA SALINITAT		ATREUEN ABELLES I POL-LIMITZADORS		ATREUEN PAPALLONES		ATREUEN OCELLS		RESISTENT A HERBÍVORS PER BARDISSA		ESPINOSA		AROMÀTICA		PARTS COMESTIBLES		INFUSIÓ O CONDIMENT	
		ALÇADA	AMPLADA											NECTAR	POL·LEN					NECTAR	POL·LEN										
<i>Euphorbia dendroides</i> Lletrerasa	Ma. Me. Ca. Dra.	1-2	1-2							S																					
<i>Euphorbia pithyusa</i> Lletrera	Ma. Me. Ei. Dra.	0,3-0,7	0,3-0,5							S				*																	
<i>Ferula communis</i> Canyaferla	Ma. Me. Ei. For. Ca.	2-3	1-2							S																					
<i>Lonicera implexa</i> Garravera	Ma. Me. Ei. For. Ca.	2,5	0,8-2							S																					
<i>Lotus dorycnium</i> (= <i>Dorycnium pentaphyllum</i>) Botja	Ma. Me. Ei. For. Ca.	0,2-1	0,3-1							S																					
<i>Medicago arborea</i> Alfals arborí	Ma. Me. Ei.	0,8-1,5	0,8-1							S				*																	
<i>Medicago citrina</i> Alfals arborí marí	Ei. Ca.	1-2	1-2						S				*																		
<i>Olea europaea</i> Ullastre	Ma. Me. Ei. For. Ca. Dra.	0,8-10	1-15							C				*																	
<i>Phillyrea media</i> Aladern menorquí	Ma. Me.	0,8-2	0,8-3							C				*																	

Ullastrar

Nom científic Nom comú	ENDÈMISME ILLES	ALÇADA AMPLADA	MIDA ORIENTATIVA PLANTA ADULTA (m)	ÉPOCA FLORACIÓ		ÉPOCA FRUCTIFICACIÓ		TIPUS FRUIT (SEC/CARNIOS) NECESSITATS HÍDRIQUES		INSOLACIÓ		PORT		TOLERÀNCIA SALINITAT		ATREUEN ABELLES I POL-LINITZADORS		ATREUEN PAPALLONES		ATREUEN OCELLS		RESISTENT A HERBÍVORS		PER BARDISSA		ESPINOSA		AROMÀTICA		PARTS COMESTIBLES		INFUSIÓ O CONDIMENT	
				IL·LUMINOSITAT SOMBRA	IL·LUMINOSITAT SOMBRA	IL·LUMINOSITAT SOMBRA	IL·LUMINOSITAT SOMBRA	IL·LUMINOSITAT SOMBRA	IL·LUMINOSITAT SOMBRA	IL·LUMINOSITAT SOMBRA	IL·LUMINOSITAT SOMBRA	IL·LUMINOSITAT SOMBRA	IL·LUMINOSITAT SOMBRA	IL·LUMINOSITAT SOMBRA	IL·LUMINOSITAT SOMBRA	IL·LUMINOSITAT SOMBRA	IL·LUMINOSITAT SOMBRA	IL·LUMINOSITAT SOMBRA	IL·LUMINOSITAT SOMBRA	IL·LUMINOSITAT SOMBRA	IL·LUMINOSITAT SOMBRA	IL·LUMINOSITAT SOMBRA	IL·LUMINOSITAT SOMBRA	IL·LUMINOSITAT SOMBRA	IL·LUMINOSITAT SOMBRA	IL·LUMINOSITAT SOMBRA	IL·LUMINOSITAT SOMBRA	IL·LUMINOSITAT SOMBRA	IL·LUMINOSITAT SOMBRA	IL·LUMINOSITAT SOMBRA			
<i>Pistacia lentiscus</i> Mata	Ma. Me. Ei. For. Ca. Dra.	0,6-7	0,8-6	*										C																			
<i>Rhamnus alaternus</i> Llampúdol	Ma. Me. Ei.	1-8	1-6	*		*		*						C																			





Els **BOSCOS DE RIBERA** i **VEGETACIÓ DE TORRENTS** no ocupen grans extensions, però són formacions d'enorme interès per les funcions biològiques i ambientals que generen, com són la regulació del cicle de l'aigua, la mobilització de les espècies de fauna mitjançant la creació de corredors biològics i la generació d'un paisatge diversificat.

Ribera i torrents

Nom científic Nom comú	ENDÈMISME ILLES	ALÇADA AMPLADA	MIDA ORIENTATIVA PLANTA ADULTA (m)	ÉPOCA FLORACIÓ		ÉPOCA FRUCTIFICACIÓ		TIPUS FRUIT (SEC/CARNOS)		NECESSITATS HÍDRIQUES		INSOLACIÓ		PORT		TOLERÀNCIA SALINITAT		ATREUEN ABELLES NECTAR POL-LINITZADORS		ATREUEN OCELLS POL-LEN		ATREUEN PAPALLONES		RESISTENT A HERBÍVORS PER BARDISSA		ESPINOSA		AROMÀTICA		PARTS COMESTIBLES		INFUSIÓ O CONDIMENT	
				ÉPOCA FLORACIÓ	ÉPOCA FRUCTIFICACIÓ	TIPUS FRUIT (SEC/CARNOS)	NECESSITATS HÍDRIQUES	INSOLACIÓ	PORT	TOLERÀNCIA SALINITAT	ATREUEN ABELLES NECTAR POL-LINITZADORS	ATREUEN OCELLS POL-LEN	ATREUEN PAPALLONES	RESISTENT A HERBÍVORS PER BARDISSA	ESPINOSA	AROMÀTICA	PARTS COMESTIBLES	INFUSIÓ O CONDIMENT															
<i>Celtis australis</i> Lledoner	Ma.	20	10-20																														
<i>Clematis flammula</i> Vidriella	Ma. Me. Ei.	1-2	2-3																														
<i>Crataegus monogyna</i> Cirerer de pastor	Ma. Me.	2-5	1,5-3																														
<i>Fraxinus angustifolia</i> Fleix	Ma.	10-20	4-6																														
<i>Hypericum perforatum</i> Herba de Sant Joan	Ma. Me. Ei. For.	0,2-0,5	0,3-0,5																														
<i>Laurus nobilis</i> Llorer	Ma. Me. Ei.	5-10	2-4																														
<i>Populus alba</i> Poll blanc	Ma. Me.	10-30	5-10																														
<i>Populus nigra</i> Poll negre	Ma. Me.	20-30	10-20																														
<i>Prunus spinosa</i> Aranyoner	Ma. Me.	3-5	1-4																														

Ribera i torrents

Nom científic Nom comú	ENDEMISME ILLES	MIDA ORIENTATIVA PLANTA ADULTA (m)		ÉPOCA FLORACIÓ		ÉPOCA FRUCTIFICACIÓ		TIPUS FRUIT (SEC/CARNOS)		NECESSITATS HÍDRIQUES		INSOLACIÓ		PORT		TOLERÀNCIA SALINITAT		ATREUEN ABELLES POL-LIMITZADORS		ATREUEN PAPALLONES		ATREUEN OCELLS		RESISTENT A HERBÍVORS		PER BARDISSA		ESPINOSA		AROMÀTICA		PARTS COMESTIBLES		INFUSIÓ O CONDIMENT	
		ALÇADA	AMPLADA																																
<i>Quercus cerrioides</i> Roure	Ma.	20	4-15	✿				🍎	🍎	S	💧	☀️	🌳			NECTAR POL-LEN	m	✿✿					🐦		✓										
<i>Rubus ulmifolius</i> Abatzer	Ma. Me. Ei. Ca.	1-3	3-6		✿					C	💧	☀️	🌙			NECTAR POL-LEN		✿✿✿✿					🐦	✓	✓	🍎									
<i>Ulmus minor</i> Om	Ma. Me. Ei.	20-30	8-10	✿		✿	🍎			S	💧	☀️	🌳			NECTAR POL-LEN	m	✿✿					🐑												
<i>Vinca difformis</i> Proenga	Ma. Me. Ei.	0,2-0,4	1-2	✿		✿	🍎			S	💧	☀️	🌿			NECTAR POL-LEN		✿✿					🐑												
<i>Vitex agnus-castus</i> Aloc	Ma. Me. Ei.	1,5-5	2-5		✿			🍎		S	💧	☀️	🌙	*	*	NECTAR POL-LEN		✿✿✿✿					🐑	✓	✓	��									







La VEGETACIÓ DE LES DUNES i el bosc que s'hi desenvolupa, el **SAVINAR**, es caracteritza per l'adaptació a suportar forts vents que, juntament amb el tipus de sòl arenós, fa que les plantes que trobem en aquests ambientss'hagin hagut d'adaptar a la mobilitat de l'arena, i també a l'aridesa que això suposa.

Dunes i savinar

Nom científic Nom comú	ENDÈMISME ILLES	ALÇADA AMPLADA	MIDA ORIENTATIVA PLANTA ADULTA (m)	ÉPOCA FLORACIÓ		ÉPOCA FRUCTIFICACIÓ		TIPUS FRUIT (SEC/CARNOUS) NECESSITATS HÍDRIQUES		INSOLACIÓ		PORT		TOLERÀNCIA SALINITAT		ATREUEN ABELLES I POL-LINITZADORS		ATREUEN PAPALLONES		ATREUEN OCELLS		RESISTENT A HERBÍVORS		PER BARDISSA		ESPINOSA		AROMÀTICA		PARTS COMESTIBLES		INFUSIÓ O CONDIMENT	
				ÉPOCA FLORACIÓ	ÉPOCA FRUCTIFICACIÓ	FRUIT SEC	FRUIT CARNUOS	NECESSITAT D'AGUA	NECESSITAT DE SOL	PORT DRET	PORT INVERTIT	NÉCTAR	POL·LEN	ABELLAS	PAPALLONES	OCELLS	HERBIVORS	BARDISSA	ESPINOSA	AROMÀTICA	PARTS COMESTIBLES	INFUSIÓ O CONDIMENT											
<i>Achillea maritima</i> Herba de Trucadors	Ma. Me. Ei. For.	0,3-0,5 0,5-1	0,5-1	✿				🍏		S	💧	☀️	✳️	*	*	*	*						✓				☕						
<i>Ammophila arenaria</i> Borró	Ma. Me. Ei. For.	0,5-1 0,8-1		✿	✿			🍎		S	💧	☀️	✳️	*																			
<i>Calystegia soldanella</i> Campaneta de la mar	Ma. Me. Ei. For.	0,1-0,2 0,2-0,4		✿				🍏		S	💧	☀️	✳️	*	*	*																	
<i>Cistus clusii</i> Romaní mascle	Ma. Ei. For.	0,3-0,5 0,3-0,4		✿				🍏		S	💧	☀️	✳️																				
<i>Eryngium maritimum</i> Card marí	Ma. Me. Ei. For. Ca.	0,4-0,6 0,4-0,6		✿				🍏		S	💧	☀️	✳️	*	*	*	*						✓										
<i>Glaucium flavum</i> Cascall marí	Ma. Me. Ei. For. Ca.	0,3-0,7 0,4-0,6		✿	✿			🍏		S	💧	☀️	✳️	*	*																		
<i>Helianthemum caput-felis</i> Caps de moix	Ma. Ei.	0,2-0,5 0,3-0,6		✿		✿	🍏			S	💧	☀️	✳️	*																			
<i>Helichrysum stoechas</i> Flor de tot l'any	Ma. Me. Ei. For. Ca. Dra.	0,2-0,5 0,3-0,6		✿	✿			🍏		S	💧	☀️	✳️	*									✓				☕						
<i>Juniperus oxycedrus</i> subsp. <i>macrocarpa</i> Càdec	Ma.	3-4 2-5		✿				🍏		C	💧	☀️	✳️	*									✓										

Dunes i savinar

Nom científic Nom comú	ENDÈMISME ILLES	ALÇADA AMPLADA	MIDA ORIENTATIVA PLANTA ADULTA (m)	ÉPOCA FLORACIÓ		ÉPOCA FRUCTIFICACIÓ		TIPUS FRUIT (SEC/CARNOUS) NECESSITATS HÍDRIQUES	INSOLACIÓ	PORT	TOLERÀNCIA SALINITAT	ATREUEN ABELLES I POL-LINITZADORS	ATREUEN PAPALLONES	ATREUEN OCELLS	RESISTENT A HERBÍVORS	PER BARDISSA	ESPINOSA	AROMÀTICA	PARTS COMESTIBLES	INFUSIÓ O CONDIMENT
				ÉPOCA FLORACIÓ	ÉPOCA FRUCTIFICACIÓ	ÉPOCA FLORACIÓ	ÉPOCA FRUCTIFICACIÓ													
<i>Juniperus phoenicea</i> subsp. <i>turbinata</i> Savina	Ma. Me. El. For. Ca. Dra.	5	2-5			*	🍎	C	💧	☀️	*						✓			
<i>Lotus cytisoides</i> Trèvol de platja	Ma. Me. El. For.	0,1-0,2	0,4-1	*	*	🍎	🍎	S	💧	☀️	*	*	*							
<i>Ononis ramosissima</i> Alorens	Ma. El. For.	0,2-0,5	0,3-0,6	*	*	🍎		S	💧	☀️	*	*								
<i>Pancratium maritimum</i> Lliri de mar	Ma. Me. El. For. Ca.	0,3-0,4	0,3-0,4	*		🍎		S	💧	☀️	*	*								
<i>Teucrium dunense</i> Herba de Sant Ponç de platja	Ma.	0,2-0,4	0,2-0,6	*		🍎		S	💧	☀️	*	*	*			✓				
<i>Thinopyrum junceum</i> (= <i>Elymus farctus</i>) Fenàs de platja	Ma. Me. El. For.	0,3-0,5	0,5-0,8	*		🍎		S	💧	☀️	*	*								
<i>Thymelaea velutina</i> Peu de milà	✓	Ma. Me.	0,4-1	0,4-1	*	*	🍎	C	💧	☀️	*									





Les formacions vegetals dels **SALOBRARS** i de la **COSTA**, es veuen abocades a suportar grans concentracions de sals procedents de l'aigua de la mar. Per això moltes espècies disposen de glàndules excretores de sals, o les van acumulant a les seves fulles i/o tiges fent-se carnoses.

En el cas de la vegetació del litoral rocós, hi trobem un conjunt d'espècies en forma de coixinets espinosos, fruit de la seva adaptació als ambients ventosos i salins de la costa balear.

Salobrars i costa

Nom científic Nom comú	ENDÈMISME ILLES	ALÇADA AMPLADA	MIDA ORIENTATIVA PLANTA ADULTA (m)	ÉPOCA FLORACIÓ		ÉPOCA FRUCTIFICACIÓ		TIPUS FRUIT (SEC/CARNOS)		NECESSITATS HÍDRIQUES		INSOLACIÓ		PORT		TOLERÀNCIA SALINITAT		ATREUEN ABELLES I POL-LINITZADORS		ATREUEN PAPALLONES		ATREUEN OCELLS		RESISTENT A HERBÍVORS		PER BARDISSA		ESPINOSA		AROMÀTICA		PARTS COMESTIBLES		INFUSIÓ O CONDIMENT	
<i>Anthemis maritima</i> Bolig de mar	Ma. Me. El.	0,2-0,4 0,4-0,8		✿				🍎	🍎	S	💧	☀️	✿	*	*													✓							
<i>Artemisia caerulescens</i> subsp. <i>gallica</i> Donzell marí	Ma. Me.	0,1-0,4 0,3-0,5		✿	✿			🍎		S	💧	☀️	✿	*	*													✓							
<i>Astragalus balearicus</i> Eixorba-rates negre	✓ Ma. Me. Ca.	0,1-0,3 0,1-0,3		✿				🍎		S	💧	☀️	✿			✿											✓								
<i>Crithmum maritimum</i> Fonoll marí	Ma. Me. El. For. Ca. Dra.	0,15-0,4 0,3-0,6		✿				🍎		S	💧	☀️	✿	*	*	✿	✿										leaf								
<i>Helichrysum italicum</i> subsp. <i>tyrrhenicum</i> Sempreviva	✓ Ma.	0,3-0,6 0,4-0,6		✿	✿			🍎		S	💧	☀️	✿	*		✿	✿									✓		coffee cup							
<i>Juncus acutus</i> Jorc	Ma. Me. El. For.	0,6-1,2 0,6-1,2		✿				🍎		S	💧	☀️	✿													✓									
<i>Launaea cervicornis</i> Socarrell	✓ Ma. Me. Dra.	0,1-0,2 0,1-0,3		✿				✿		S	💧	☀️	✿	*		✿										✓									
<i>Limonium virgatum</i> Saladina	Ma. Me. For.	0,1-0,4 0,1-0,4		✿				🍎		S	💧	☀️	✿	*	*	✿	✿																		

Salobrars i costa

Nom científic Nom comú	ENDÈMISME ILLES	MIDA ORIENTATIVA PLANTA ADULTA (m)		ÉPOCA FLORACIÓ	ÉPOCA FRUCTIFICACIÓ	TIPUS FRUIT (SEC/CARNOS) NECESSITATS HÍDRIQUES	INSOLACIÓ	PORT	TOLERÀNCIA SALINITAT	ATREUEN ABELLES I POL-LIMITZADORS	ATREUEN PAPALLONES	ATREUEN OCELLS	RESISTENT A HERBÍVORS	PER BARDISSA	ESPINOSA	AROMÀTICA	PARTS COMESTIBLES	INFUSIÓ O CONDIMENT
		ALÇADA	AMPLADA															
<i>Malva subovata</i> (= <i>Lavatera maritima</i>) Malva	Ma. Me. Ei. Ca.	0,5-1	0,5-0,8	* *		🍎	S	💧	☀️	*	*	*	*	*	*	*	*	
<i>Pallenis maritima</i> (= <i>Asteriscus maritimus</i>) Botó de foc	Ma. Me. Ei. For. Dra.	0,2-0,4	0,3-0,5	*	*	🍎	S	💧	☀️	*	*	*	*	*	*	*	*	
<i>Santolina magonica</i> Camamilla	✓ Ma. Me.	0,3-0,4	0,4-0,6	*	*	🍎	S	💧	☀️	*	*	*	*	*	*	*	✓	*
<i>Tamarix canariensis</i> Tamarell	Ma. Me. Ei. For.	5-6	4-5	*		🍎	S	💧	☀️	*	*	*	*	*	*	*	✓	
<i>Tamarix gallica</i> Tamarell	Ma. Me. Ei. For.	6-10	6-5	*		🍎	S	💧	☀️	*	*	*	*	*	*	*	✓	







Els **PENYALS** són vertaders santuaris de biodiversitat insular degut a la seva especialització i a la gran quantitat d'endemismes que hi alberguen.

Les espècies que hi trobem sovint estan caracteritzades per flors vistoses degut a que han de cridar molt l'atenció als pol·linitzadors.

Viuen en un ambient pràcticament vertical i amb les plantes ben separades perquè només poden viure en les esclerxes o en les petites acumulacions de sòl entre la roca.

Penyals

Nom científic Nom comú	ENDÈMISME ILLES	MIDA ORIENTATIVA PLANTA ADULTA (m)		ÉPOCA FLORACIÓ		ÉPOCA FRUCTIFICACIÓ		TIPUS FRUIT (SEC/CARNOUS) NECESSITATS HÍDRIQUES		INSOLACIÓ		PORT		TOLERÀNCIA SALINITAT		ATREUEN ABELLES I POL-LIMITZADORS		ATREUEN PAPALLONES		ATREUEN OCELLS		RESISTENT A HERBÍVORS		PER BARDISSA		ESPINOSA		AROMÀTICA		PARTS COMESTIBLES		INFUSIÓ O CONDIMENT	
				ALÇADA	AMPLADA					SOL	ROCA			NECTAR	CARNIUS	SOL	ROCA			NECTAR	CARNIUS	SOL	ROCA			NECTAR	CARNIUS	SOL	ROCA				
<i>Acer granatense</i> Rotaboc	Ma.	3-6	2-3																														
<i>Capparis spinosa</i> Taparera	Ma. Me. El.	0,2-0,5	0,6-1,5									*						*															
<i>Cheirolophus intybaceus</i> Bracera de roca	Ma. El. For.	0,5-1	0,5-1																														
<i>Dianthus rupicola</i> subsp. <i>bocchoriana</i> Clavell de roca		Ma.	0,2-0,6	0,2-0,6																													
<i>Digitalis minor</i> Didalera		Ma. Me. Ca. Dra.	0,2-0,4	0,2-0,3																													
<i>Hippocrepis balearica</i> Violeta de penyal		Ma. Me. Ca. Dra.	0,3-0,5	0,5-1																													
<i>Lomelosia cretica</i> Col de penya	Ma. Me. El. For. Ca. Dra.	0,4-0,8	0,4-0,8																														



La vegetació de **MUNTANYA** es concentra a les parts altes de l'illa de Mallorca. Hi podem trobar comunitats que eren molt més abundants en el passat, testimonis del bosc fred i humit del Quaternari.

Hi són presents algunes espècies caducifòlies, així com plantes en forma de coixinet espinós que són fruit de la seva adaptació als ambients ventosos dels cims.

A les rossegueres hi trobem una vegetació especialitzada a viure sobre un substrat móbil i amb pocs recursos.

L'expansió i conservació d'aquestes formacions està fortament condicionada per la sobrepoblació de cabra domèstica assilvestrada que les devora.

Muntanya

Nom científic Nom comú	ENDÈMISME ILLES	MIDA ORIENTATIVA PLANTA ADULTA (m)		ÉPOCA FLORACIÓ		ÉPOCA FRUCTIFICACIÓ		TIPUS FRUIT (SEC/CARNIOS) NECESSITATS HÍDRIQUES		INSOLACIÓ		PORT		TOLERÀNCIA SALINITAT		ATREUEN ABELLES I POL-LINITZADORS		ATREUEN PAPALLONES		ATREUEN OCELLS		RESISTENT A HERBÍVORS PER BARDISSA		ESPINOSA		AROMÀTICA		PARTS COMESTIBLES		INFUSIÓ O CONDIMENT	
		ALÇADA	AMPLADA																												
<i>Buxus balearica</i> Boix		Ma. Ca.	1-4	2-3	*			*		*		S	*	*	*			*		*		*		*		*		*			
<i>Clinopodium rouyanum</i>	✓	Ma.	0,1-0,3	0,2-0,3	*	*		*		*		S	*	*	*			*		*		*		*		*		✓			
<i>Hypericum balearicum</i> Estepa joana	✓	Ma. Me. Ei. Ca. Dra.	0,5-1,3	0,7-1	*	*		*		*		S	*	*	*			*		*		*		*		*		✓			
<i>Teucrium asiaticum</i> Brutònica	✓	Ma. Me.	0,1-0,4	0,1-0,5	*			*		*		S	*	*	*			*		*		*		*		*		✓			
<i>Teucrium balearicum</i> Eixorba-rates blanc	✓	Ma.	0,1-0,3	0,2-0,4	*	*		*		*		S	*	*	*			*		*		*		*		*		✓	✓		





Els jardins ecosistèmics

Hi ha tants tipus de jardins com persones que els dissenyen. A finals de segle XX va començar a sorgir la idea de la jardineria ecosistèmica, que cerca crear i mantenir jardins que siguin sostenibles i saludables per als ecosistemes locals. Es basa en el coneixement dels ecosistemes naturals i en la comprensió de com les plantes interactuen amb el medi ambient, així com en l'ús de tècniques sostenibles de jardineria per reduir el consum d'aigua, l'ús de pesticides i altres pràctiques de la jardineria tradicional que poden posar en perill la nostra salut i la del medi. La natura al jardí no és només una moda, és una necessitat que afavoreix l'equilibri biològic.

A més a més, promou la diversitat de plantes, incloent espècies natives i autòctones, que són més resistents a les plagues i malalties i requeriran menys aigua i recursos per créixer. Fa servir el compostatge i altres tècniques de fertilització natural per afavorir la salut dels jardins. En general és una manera d'embellir el paisatge i al mateix temps preservar la biodiversitat i els ecosistemes locals. Per això des de la Xarxa Forestal es promouen aquests tipus de jardins en els centres educatius.

Una de les formes de contribuir a la millora de la biodiversitat del nostre jardí és fer que sigui el més atractiu

possible per a les **PAPALLONES** i altres insectes pol·linitzadors com ara les abelles. Això no només estimularà la presència d'altres tipus de fauna, sinó que també en farà un lloc més atractiu i agradable.

Per això podeu tenir en compte els següents punts:

- » És recomanable que escolliu un lloc del jardí que rebi molta llum solar, que estigui protegit del vent i on es puguin col·locar pedres, troncs i altres elements on les papallones puguin descansar i refugiar-se.
- » Podeu plantar espècies amb flors de colors vistosos i que continguin abundant nèctar perquè les papallones adultes puguin alimentar-se.
- » És important seleccionar plantes que floreixin en diferents èpoques de l'any, perquè les papallones puguin trobar aliment durant tot l'any.
- » Evidentment, eviteu l'ús de qualsevol insecticida o pesticida.
- » Les papallones necessiten aigua per sobreviure, se'l pot posar un plat o una petita font amb aigua neta.
- » Podeu investigar les espècies de papallones més comunes a la vostra zona. D'aquesta manera, podeu plantar les flors que aquestes espècies prefereixen.

Amb aquests passos, podreu crear un jardí de papallones que les atraurà i els proporcionarà un hàbitat adequat per viure i sobreviure. Per ajudar-vos, aquí teniu un llistat de les espècies més comunes de **papallones diürnes amb**

les plantes anomenades hostes o nutritícies on normalment ponen els ous i de les quals s'alimenten les erugues, d'aquesta forma estimulareu la posta d'ous al vostre jardí i podreu gaudir de tots els estadis del seu cicle vital.



NOM CIENTÍFIC	FAMÍLIA	NOM COMÚ	PLANTES NUTRÍCIES
<i>Argynnis pandora</i>	Nymphalidae	Papallona grossa de les violetes	Viola i Ruta.
<i>Aricia cramera</i>	Lycaenidae	Rogeta de l'esteperol	Geraniàcies: <i>Erodium cicutarium</i> , <i>Erodium malacoides</i> , etc. Cistàcies: <i>Helianthemum</i> i <i>Tuberaria</i> .
<i>Callophrys rubi</i>	Lycaenidae	Verdeta	Lleguminoses: <i>Lotus</i> , <i>Trifolium</i> , etc. Geraniàcies: <i>Geranium</i> .
<i>Celastrina argiolus</i>	Lycaenidae	Blaveta de l'heura	<i>Hedera helix</i> . Lleguminoses: <i>Genista</i> , <i>Melilotus</i> , <i>Medicago sativa</i> . <i>Ilex aquifolium</i> , <i>Rubus</i> , <i>Arbutus unedo</i> , <i>Rhamnus</i> , <i>Erica arborea</i> , <i>Clematis</i> , etc.
<i>Charaxes jasius</i>	Nymphalidae	Papallona de l'arbocera	<i>Arbutus unedo</i> , <i>Sorghum</i> , <i>Laurus nobilis</i> , etc.
<i>Coenonympha pamphilus</i>	Satyridae	Grogueta	Gramínees: <i>Poa annua</i> , <i>Festuca</i> , <i>Agrostis</i> , <i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Dactylis glomerata</i> , etc.
<i>Colias crocea</i>	Pieridae	Safranera	Lleguminoses.
<i>Gonepteryx cleopatra</i>	Pieridae	Papallona groga	<i>Rhamnus alaternus</i> .
<i>Hipparchia fidia</i>	Satyridae	Papallona de penya	Gramínees: <i>Oryzopsis</i> , <i>Dactylis</i> , <i>Cynodon</i> , <i>Brachypodium</i> , <i>Festuca</i> , <i>Poa</i> , <i>Lolium</i> , etc.
<i>Lampides boeticus</i>	Lycaenidae	Blaveta del pèsol	Lleguminoses: <i>Pisum</i> , <i>Vicia</i> , <i>Onobrychis</i> , <i>Hedysarum</i> , <i>Genista</i> , <i>Lotus</i> , <i>Lathyrus</i> , <i>Medicago</i> , <i>Astragalus</i> , etc. <i>Capparis spinosa</i> .
<i>Lasiommata megera</i>	Satyridae	Papallona del margall	Gramínees: <i>Poa</i> , <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Brachypodium</i> , <i>Bromus</i> , <i>Festuca ovina</i> , <i>Agrostis</i> , <i>Aegilops</i> , <i>Stipa</i> , <i>Hordeum</i> , etc.

NOM CIENTÍFIC	FAMÍLIA	NOM COMÚ	PLANTES NUTRÍCIES
<i>Leptidea sinapis</i>	Pieridae	Blanqueta	Lleguminoses: <i>Lathyrus, Lotus corniculatus, Sinapis, Vicia, Coronilla, Medicago</i> , etc.
<i>Leptotes pirithous</i>	Lycaenidae	Blaveta del romaní	Lleguminoses, Rosàcies, Plumbaginàcies, etc.
<i>Lycaena phlaeas</i>	Lycaenidae	Rogeta	<i>Rumex i Polygonum.</i>
<i>Lysandra bellargus</i>	Lycaenidae	Blaveta africana	Lleguminoses.
<i>Maniola jurtina</i>	Satyridae	Papallona grossa de garriga	Gramínies: <i>Brachypodium, Elymus, Poa annua, Festuca, Agrostis, Dactylis glomerata, Stipa, Hordeum, Anthoxanthum odoratum, Bromus, Lolium</i> , etc.
<i>Papilio machaon</i>	Papilionidae	Rei	Umbel·líferes: <i>Foeniculum vulgare i Daucus carota.</i> Rutàcies: <i>Ruta</i> .
<i>Pararge aegeria</i>	Satyridae	Papallona del gram	Gramínies: <i>Hordeum, Elymus, Brachypodium, Poa, Dactylis</i> , etc.
<i>Pieris brassicae</i>	Pieridae	Blanca de la col	Crucíferes: <i>Brassica oleracea, Brassica napus, Cardamine, Raphanus</i> , etc. <i>Tropaeolum majus, Reseda lutea</i> , etc.
<i>Pieris napi</i>	Pieridae	Blanqueta del rave	Crucíferes: <i>Brassica oleracea, Brassica napus, Sisymbrium officinale, Sinapis arvensis, Nasturtium officinale, Biscutella, Raphanus</i> . Resedàcies: <i>Reseda lutea, Reseda alba</i> .
<i>Pieris rapae</i>	Pieridae	Blanqueta de la ravenissa	Crucíferes: <i>Brassica oleracea, Brassica napus, Raphanus, Arabis, Sinapis, Lepidium, Biscutella, Sisymbrium</i> , etc. Resedàcies: <i>Reseda lutea, Tropaeolum majus, Capparis spinosa, Atriplex</i> .
<i>Polyommatus celina</i>	Lycaenidae	Blaveta africana	Lleguminoses: <i>Trifolium, Medicago</i> , etc.
<i>Pontia daplidice</i>	Pieridae	Blanqueta tacada	Crucíferes: <i>Sinapis, Sisymbrium, Arabis</i> . Resedàcies: <i>Reseda luteola</i> .
<i>Pyronia cecilia</i>	Satyridae	Papallona de garriga	Gramínies: <i>Brachypodium, Aira, Poa, Festuca</i> , etc.
<i>Vanessa atalanta</i>	Nymphalidae	Papallona reina	Urticàcies: <i>Urtica, Parietaria</i> . Compostes: <i>Carduus</i> , etc.
<i>Vanessa cardui</i>	Nymphalidae	Migradora dels cards	Compostes: cards. Malvàcies.



Les ABELLES són molt importants com a insectes pol·linitzadors.

Es calcula que el 75% dels cultius d'aliments a nivell mundial

depenen de la pol·linització per insectes i especialment per abelles. A tota Europa, les poblacions d'abelles i les reserves de mel han disminuït dràsticament des del 2015, en algunes zones fins a un 30% anual a causa de les temperatures extremes, les inundacions, les sequeres i altres fenòmens conseqüència del canvi climàtic. Per això, **també s'han inclòs indicacions al catàleg per donar informació sobre l'interès que cada espècie pot tenir pel que fa a la producció de pol·len i nèctar.**

Les abelles poden arribar a desplaçar-se fins a 3 km en la recerca de pol·len. El nostre jardí pot contribuir a la pol·linització del nostre entorn. **Alguns consells:**

- » Poseu a disposició aigua en forma de bassa o pica d'aigua. Hi podeu posar dins algunes pedres que sobresurtin de la superfície o bé senzillament uns taps de suro; les abelles no saben nedar i aquests elements permeten a aquests insectes beure aigua.
- » Trieu espècies que impliquin una floració esglaonada al llarg de l'any, d'aquesta manera s'ofereix aliment a les abelles el màxim de mesos possibles.
- » Evitau l'ús de pesticides que poden ser perjudicials per a les abelles.

També podem fer que el nostre jardí sigui atractiu per als OCELLS. Per això hi ha diversos factors que cal tenir en compte:



- » Poseu a disposició aigua en forma de bassa, font, plat o banyera d'aigua. Els ocells necessiten aigua per beure i banyar-se.
- » Planteu arbres i arbustos que proporcionin lloc per a la nidificació, refugi i alimentació dels ocells.
- » Trieu plantes que atrauen insectes, que són una font d'aliment per als ocells. Trieu flors que floreixin en diferents èpoques de l'any per proporcionar aliments durant tot l'any.
- » Oferiu menjar en menjadors d'ocells omplerts de llavors o fruites, o bé planteu flors que produueixen llavors o fruites que els ocells puguin menjar.
- » Proporcioneu llocs per a la nidificació amb caixes-niu. Podeu triar caixes-niu amb diferents mides i formes depenen de l'espècie que vulgueu atraure.
- » Evitau l'ús de pesticides, que poden ser perjudicials per als ocells i altres animals.
- » Creau diferents nivells amb arbres alts, arbustos mitjans i flors baixes per proporcionar diferents zones per als ocells.
- » Creau espais oberts perquè els ocells puguin volar i moure's lliurement.

A continuació, teniu una **llista d'espècies d'ocells i el seu tipus d'alimentació** per ajudar-vos a planificar un jardí que sigui atractiu per a ells i gaudir de la seva presència al vostre jardí.

NOM CIENTÍFIC	NOM COMÚ	ALIMENTACIÓ
<i>Carduelis cannabina</i>	Passarell	Granívori. Llavors petites que va cercant enterra. Captura insectes en època reproductiva.
<i>Carduelis carduelis</i>	Cadernera	Granívori. Llavors de cards i altres moltes plantes de la família de les compostes. També consumeix brots florals i llavors de ravenisses (Crucíferes).
<i>Carduelis spinus</i>	Lleonet	Granívori. Llavors de <i>Pinus halepensis</i> , <i>Ulmus minor</i> i plantes herbàcies. Captura insectes en època reproductiva.
<i>Carduelis chloris</i>	Verderol	Granívori. Llavors de <i>Pinus halepensis</i> , <i>Pinus pinea</i> , de ravenissa (Crucíferes). Fruits carnosos quan alimenten als polls. Captura insectes en època reproductiva.
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Durbec	Fruits i llavors. <i>Rosa</i> sp., <i>Olea europaea</i> , <i>Celtis australis</i> . Brots i tiges tendres d'arbres i arbusts.
<i>Columba palumbus</i>	Tudó	Fruits carnosos. <i>Pistacia lentiscus</i> , <i>Olea europaea</i> , <i>Quercus</i> . Fulles de dicotiledònies.
<i>Emberiza cirlus</i>	Sól.lera boscana	Llavors de gramínees. Captura insectes en època reproductiva.
<i>Erithacus rubecula</i>	Ropit	Insectívori. Completa la dieta amb glans de <i>Quercus</i> trossejats i fruits carnosos
<i>Fringilla coelebs</i>	Pinsà	Omnívori. Llavors de <i>Lavandula dentata</i> , <i>Heliotropium europaeum</i> , Girasol, etc. Fruits carnosos. Brots tendres.
<i>Lanius senator</i>	Capsigrany	Utilitza plantes espinoses on clava els insectes que menja.
<i>Loxia curvirostra</i>	Trencapinyons	Llavors de <i>Pinus halepensis</i> . Secundàriament altres fruits tant secs com carnosos.
<i>Miliaria calandra</i>	Sól.lera	Llavors de gramínees. Captura insectes en època reproductiva.
<i>Oriolus oriolus</i>	Oriol	Insectívori. Fruits carnosos de <i>Ficus carica</i> , <i>Morus alba</i> , <i>Rubus ulmifolius</i> , <i>Sambucus</i> , etc.

NOM CIENTÍFIC	NOM COMÚ	ALIMENTACIÓ
<i>Parus major</i>	Ferrero	Insectívor. A tardor incorpora fruits carnosos de <i>Rubus ulmifolius</i> , <i>Ficus carica</i> , <i>Arbutus unedo</i> , etc.
<i>Passer domesticus</i>	Gorrió	Omnívor. Llavors de gramínees i fruits carnosos.
<i>Phoenicurus ochruros</i>	Coa-roja de barraca	Invertebrats. Ocasionalment fruits carnosos i llavors.
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Coa-roja	Insectívor. Durant la migració menja fruits carnosos.
<i>Regulus ignicapilla</i>	Reietó cellablanc	Insectívor. Pot polinitzar <i>Rhamnus alaternus</i> .
<i>Serinus serinus</i>	Gafarró	Granívor. Tot tipus de llavors tant de fruit sec com carnós
<i>Streptopelia decaocto</i>	Tórtora turca	Granívor. Principalment de cereals
<i>Streptopelia turtur</i>	Tórtora	Granívor. Principalment de cereals
<i>Sturnus vulgaris</i>	Estornell	Frugívor a tardor i hivern. Fruits carnosos. A primavera i estiu s'alimenta d'invertebrats.
<i>Sylvia atricapilla</i>	Busqueret de capell	Insectívor. Encara que a tardor i hivern s'alimenta de fruits carnosos.
<i>Sylvia cantillans moltonii</i>	Busqueret de garriga	Insectívor. Pot menjar llavors de plantes herbàcies i fruits carnosos. Pot pol-linitzar d'algunes plantes.
<i>Sylvia melanocephala</i>	Busqueret de cap negre	Insectívor. Encara que a tardor i hivern s'alimenta de fruits carnosos.
<i>Turdus merula</i>	Mèrlera	Insectívor. Pot menjar llavors de plantes herbàcies i fruits carnosos. Pot pol-linitzar d'algunes plantes.
<i>Turdus philomelos</i>	Tord	Invertebrats. Encara que a tardor i hivern s'alimenta de fruits carnosos.
<i>Turdus viscivorus</i>	Tord	Invertebrats. Encara que a tardor i hivern s'alimenta de fruits carnosos.
<i>Luscinia megarhynchos</i>	Rossinyol	Insectívor. Complementa la seva dieta amb fruits carnosos a finals d'estiu i tardor abans de la migració.

«Catàleg de plantes autòctones
del viver forestal de les Illes Balears»

© Text: Carles Cardona Ametller

© Disseny i maquetació: susanacardona.es

© Fotografies: Xarxa Forestal i Carles Cardona Ametller

© de l'edició: Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural. Govern de les Illes Balears.

Impressió: Amadip Esment

Dipòsit legal: PM XXX-2024


Amb la col·laboració de tot l'equip del CEFOR i del Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural.

Citació d'aquesta publicació:

Cardona, C. 2024. Catàleg de plantes autòctones del viver forestal de les Illes Balears. Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl. Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural. Govern de les Illes Balears. Palma.



El **Centre Forestal de les Illes Balears** es pot visitar a qualsevol època de l'any, encara que és a final d'estiu i a la tardor quan més planta tenim disponible.



Trobareu els **horaris i més informació** a l'apartat «Boscos» de la web de la Xarxa Forestal:

xarxaforestal.org



**Conselleria d'Agricultura,
Pesca i Medi Natural**

Direcció General de Medi Natural
i Gestió Forestal



CEFOR MENUT
CENTRE FORESTAL DE LES ILLES BALEARIS



**XARXA
FORESTAL**